

FISA DE SELECȚIE A PACIENȚILOR CU AVC ISCHEMIC PENTRU FIBRINOLIZĂ I.V.

Completarea tuturor rubricilor este obligatorie!

Următoarele rubrici constituie criteriile de includere și trebuie bifate cu "DA". Orice "NU" exclude tromboliza i.v

Pacientul are vârsta peste 18 ani	DA		NU	
Pacientul prezintă semne și simptome de AVC acut	DA		NU	
Există certitudinea debutului simptomatologiei în ultimele 180 min*	DA		NU	
Pacientul era independent anterior evenimentului actual*	DA		NU	
Există un deficit neurologic măsurabil pe scala NIHSS (scor < 25)	DA		NU	
CT cerebral exclude hemoragia cerebrală sau altă patologie	DA		NU	
Au fost verificate criteriile imagistice pentru tromboliză (scor ASPECTS ≥7)	DA		NU	
Trombocite > 100.000/ mmc	DA		NU	
Glicemia > 50 mg/dL	DA		NU	
INR ≤ 1,7	DA		NU	

Următoarele rubrici constituie criteriile de excludere și trebuie bifate cu "NU". Orice "DA" exclude tromboliza i.v.

Interval < 3 ore

Semne și simptome de AVC rapid și spontan remisive (sub 30 min) sau NIHSS < 6**	DA		NU	
Pacientul a suferit un traumatism cranian** sau un AVC în ultimele 3 luni	DA		NU	
Pacientul a suferit un infarct de miocard în ultimele trei luni**	DA		NU	
Pacientul a suferit o intervenție chirurgicală majoră în ultimele 2 săptămâni	DA		NU	
Pacientul are în antecedente o hemoragie intracraniană, sau malformație arteriovenoasă cunoscută	DA		NU	
Există suspiciunea de hemoragie subarahnoidiană, sau anevrism cunoscut	DA		NU	
Tumoră cerebrală în evoluție	DA		NU	
TA > 185/ 110 mm Hg	DA		NU	
Sarcină în evoluție**, sau mai puțin de 15 zile postpartum	DA		NU	
Hemoragie gastrointestinală sau de tract urinar în ultimele 21 zile**	DA		NU	
Puncție arterială în loc necompresibil, sau biopsie de organe interne în ultimele 7 zile	DA		NU	
Criză convulsivă la debut, ce nu poate fi atribuită debutului AVC**	DA		NU	
Pacientul a primit tratament anticoagulant în ultimele 48 de ore, cu creșterea APTT	DA		NU	
Pacientul a primit tratament cu inhibitori de trombină sau de factor X activat în ultimele 48 ore	DA		NU	
Pacientul este cunoscut cu ciroză hepatică, varice esofagiene, insuficiență hepatică, hepatită activă	DA		NU	
Fractură deschisă sau altă sângerare activă	DA		NU	

Interval 3- 4,5 ore

Vârsta peste 80 ani **	DA		NU	
NIHSS > 25**	DA		NU	
Tratamentul anticoagulant oral indiferent de valoarea INR**	DA		NU	
Istoric de diabet zaharat si accident vascular cerebral**				

(*) vezi detalii în protocol

(**) : constituie în prezent contraindicații relative; un medic cu experiență poate aprecia raportul beneficiu /risc și poate decide să efectueze fibrinoliza în prezența unuia sau mai multor contraindicații relative.

ÎN CAZUL ÎN CARE TROMBOLIZA I.V. NU SE EFECTUEAZĂ PRECIZAȚI EXPLICIT MOTIVUL :

.....

DATA __ __ / __ __ / __ __ __ __ ORA __ __ / __ __

SEMNĂTURA ȘI PARAFĂ MEDICULUI